

Сиалис: инструкция по применению

1. Состав
2. Фармакологическое действие
3. Способ применения и дозы
4. Форма выпуска
5. Условия отпуска из аптек
6. Условия хранения препарата Сиалис
7. Срок годности препарата Сиалис

Состав

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой
1 табл. ядро

Активное вещество: тадалафил 5 мг. (Tadalafil)

Вспомогательные вещества: лактозы моногидрат — 109,65 мг; лактозы моногидрат (высушенный распылением) — 17,5 мг; гипролоза — 1,22 мг; гипролоза экстра тонкая — 2,8 мг; натрия лаурилсульфат — 0,49 мг; МКЦ — 26,25 мг; кроскармеллоза натрия — 11,2 мг; магния стеарат (растительный) — 0,88 мг

Оболочка пленочная: Opadry желтый (У-30-12863-А) (лактозы моногидрат — 3,72 мг, гипромеллоза — 2,59 мг, титана диоксид — 1,54 мг, триацетин — 0,74 мг, краситель железа оксид желтый — 0,16 мг) — 8,75 мг

Фармакологическое действие

Фармакологическое действие — улучшающее эректильную функцию.

Способ применения и дозы

Внутрь. Эректильная дисфункция (ЭД). Для пациентов с частой сексуальной активностью (более 2 раз в неделю): рекомендованная частота приема — ежедневно, 5 мг 1 раз в сутки, в одно и то же время, вне зависимости от приема пищи. Суточная доза может быть снижена до 2,5 мг, в зависимости от индивидуальной чувствительности.

Для пациентов с нечастой сексуальной активностью (реже 2 раз в неделю): рекомендовано назначение препарата Сиалис в дозе 20 мг непосредственно



перед сексуальной активностью, согласно инструкции по медицинскому применению препарата. Максимальная суточная доза препарата Сиалис составляет 20 мг.

ДГПЖ или ЭД/ДГПЖ. Рекомендуемая доза препарата Сиалис при применении 1 раз в сутки составляет 5 мг; препарат следует принимать приблизительно в одно и то же время дня, независимо от времени сексуальной активности. Продолжительность лечения устанавливается врачом индивидуально.

Особые группы пациентов

У пациентов с почечной недостаточностью легкой (С_l креатинина от 51 до 80 мл/мин) и умеренной степени тяжести (С_l креатинина от 31 до 50 мл/мин) коррекция дозы не требуется.

У пациентов с тяжелой степенью почечной недостаточности (С_l креатинина <30 мл/мин и на гемодиализе) применение препарата Сиалис противопоказано.

Форма выпуска

Таблетки, покрытые пленочной оболочкой, 5 мг. По 14 табл. в блистере, состоящем из фольги алюминиевой ламинированной и пленки ПВХ/ПЭ/ПХТФЭ. По 1 или 2 бл. помещают в пачку картонную.

Условия отпуска из аптек

По рецепту.

Условия хранения препарата Сиалис

При температуре не выше 30 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

Срок годности препарата Сиалис

3 года.

Не применять по истечении срока годности, указанного на упаковке.